

MRE-Hygiene-Empfehlungen

Regelungsbereich: Ambulante Pflegeeinrichtungen



Organisatorische Aufgaben		
Verfahrens-anweisung	Routine	MRE
Schulung / Unterweisung	Alle Pflege- und Hauswirtschaftskräfte sind gemäß Hygieneplan in die Belange der Hygiene (einschließlich des Umganges mit MRE) zu unterweisen	Siehe Routine, zusätzlich Nur hinsichtlich des Umgangs mit MRE geschultes Personal einsetzen
Dokumentation		<ul style="list-style-type: none"> ▪ MRE-Überleitungsbogen ausfüllen und in der Dokumentation führen ▪ MRSA: Sanierungsbogen ausfüllen und in der Dokumentation führen
Unterbringung		Mitbewohner mit Immunsuppression (z.B. Chemotherapie) sollten bei direkten Kontakten Schutzkleidung tragen
Transport und Verlegung	Patienten vor Transport die Hände desinfizieren lassen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vor dem Transport / Verlegung die Zieleinrichtung informieren ▪ Transport- / Rettungsdienst bei Anmeldung der Fahrt informieren ▪ Begleitpersonen informieren ▪ Überleitbogen ausfüllen und mitgeben ▪ Vorbereitung der Patienten zum Transport siehe Checkliste „Vorbereitung Krankentransport“ <p>Über die Erfordernis eines qualifizierten Krankentransportes entscheidet der behandelnde Arzt</p>
Information von Kontaktpersonen		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Personen mit engem professionellen Kontakt (z.B. Friseur, Physiotherapie, Fußpflege) sollten über die einzuhaltenden Hygienemaßnahmen informiert sein. Medizinische Informationen (Keim, Erkrankung etc.) sind nicht mitzuteilen (Schweigepflicht) ▪ Soziale Kontaktpersonen (Angehörige, Freunde, Besucher) sollten nach Möglichkeit über die hygienischen Anforderungen informiert werden (Informationsflyer des MRE-Netz Mittelhessen aushändigen)

MRE-Hygiene-Empfehlungen

Regelungsbereich: Ambulante Pflegeeinrichtungen



Hygienische Anforderungen an das Pflegepersonal		
Verfahrens-anweisung	Routine	MRE
Durchführung der Pflege	Siehe Pflegestandard / Hygieneplan des Unternehmens	Wenn möglich MRE-Betroffene am Ende der Pflgetouren versorgen
Händedesinfektion	<p>Fünf Indikationen der Händedesinfektion nach WHO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Vor</u> Patienten-Kontakt 2. <u>Vor</u> aseptischen Tätigkeiten 3. <u>Nach</u> Kontakt mit potentiell infektiösem Material sowie <u>nach</u> Ausziehen der Schutzhandschuhe 4. <u>Nach</u> Patienten-Kontakt 5. <u>Nach</u> Kontakt zur unmittelbaren Umgebung der Patientenumgebung 	<p>Siehe Routine, zusätzlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vor Verlassen des Zimmers ▪ Nach Verlassen der Wohnung
Schutzhandschuhe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vor Manipulation an Wunden, Kathetern Sonden, Tracheostoma, sonstige Stomata ▪ Vor möglichem Kontakt mit erregerhaltigem Material (z.B. Stuhl, Urin, Blut, etc.) ▪ Indikationen zum Handschuhwechsel beachten 	<p>Siehe Routine, zusätzlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ beim Betten machen ▪ beim Bettwäschen-Wechsel
Schutzkittel Einmalschürzen	<p>Vor möglichem Kontakt mit erregerhaltigem Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vor Manipulation an Wunden, Kathetern Sonden, Tracheostoma, sonstige Stomata ▪ Vor engem pflegerischen Kontakt ▪ Vor dem Betten machen/ Bettwäsche wechseln ▪ Flüssigkeitsdichte Schürzen, wenn mit einer Durchnässung zu rechnen ist. ▪ Bei sichtbarer Kontamination der Arbeitskleidung 	<p>Siehe Routine, zusätzlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Langärmeliger Schutzkleidung mit Bündchen und bei Feuchtarbeit (Einmalartikel) ▪ Einmal Schutzschürze

MRE-Hygiene-Empfehlungen

Regelungsbereich: Ambulante Pflegeeinrichtungen



Mund- Nasen-Schutz	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Immer wenn mit infektiösen Aerosolen zu rechnen ist, z.B. absaugen. Wundspülung, Erbrechen ▪ Bei ausgedehnten / umfangreichen Verbandswechsel 	<p>Siehe Routine, zusätzlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ beim Betten machen
--------------------	--	--

Hygienische Anforderungen im Pflegeablauf		
Verfahrens-anweisung	Routine	MRE
Pflegehilfsmittel Pflegeutensilien Instrumente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufbereitung gemäß Herstellerangaben bzw. R+D Plan ▪ RR-Geräte mit Einmalpapierunterlage am Oberarm benutzen. ▪ Desinfektion der Stethoskop-Membran mit einem nicht-alkoholischen, VAH-gelisteten Desinfektionsmittel nach jedem Patienten (Herstellerangaben beachten) 	<p>Siehe Routine, zusätzlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desinfektion nach Herstellerangaben nach jeder Benutzung (auch wenn diese Utensilien Patienteneigentum sind) durch den Patienten / Angehörigen ▪ Nur patienteneigene Medizinprodukte einsetzen ▪ Nach Möglichkeit Einmalinstrumente nutzen
Wäsche		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bett- und Leibwäsche verwenden, die bei mind. 60°C mit Vollwaschmittel waschbar sind ▪ In der Sanierungsphase (MRSA) Bett- und Leibwäsche täglich wechseln.
Abfall	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Medizinische Abfälle z.B. spitze scharfe Gegenstände in durchstichsicheren, bauartgeprüften Behältern sammeln. ▪ Später alles dem Hausmüll zuführen 	<p>Siehe Routine, zusätzlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abfälle im Zimmer sammeln und im Doppelsackverfahren später dem Hausmüll zuführen
Geschirr		Möglichst in Geschirrspüler bei mind. 65°C Temperatur aufbereiten